

**VII PREMIO JORGE JUAN DE MATEMÁTICAS  
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE**

Alicante, 5 de noviembre de 2004

TEORÍA DE NÚMEROS

- 1. Demostrar que existen infinitos números primos de la forma  $\frac{m^2 + m + 1}{n}$ , con  $m$  y  $n$  enteros positivos.**
- 2. Probar que entre cualquier conjunto de 39 enteros consecutivos positivos, la suma de los dígitos de uno de ellos es divisible por 11.**

**VII PREMIO JORGE JUAN DE MATEMÁTICAS  
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE**

Alicante, 5 de noviembre de 2004

TEORÍA DE NÚMEROS

**1. Demostrar que existen infinitos números primos de la forma  $\frac{m^2 + m + 1}{n}$ , con  $m$  y  $n$  enteros positivos.**

SOLUCIÓN:

Supongamos que el número de primos de la forma  $\frac{m^2 + m + 1}{n}$ , con  $m$  y  $n$  enteros positivos sea finito. Sea  $P$  su producto. Entonces ninguno de esos primos divide a  $P^2 + P + 1$ . Sea entonces  $q$  un primo cualquiera que divida a  $P^2 + P + 1$ . Se tiene que  $P^2 + P + 1 = qY$  para algún entero positivo  $Y$ . Sin embargo  $q = \frac{P^2 + P + 1}{Y}$ , lo que contradice que el número de primos de la forma dada sea finito.

**2. Probar que entre cualquier conjunto de 39 enteros consecutivos positivos, la suma de los dígitos de uno de ellos es divisible por 11.**

SOLUCIÓN:

Entre los primeros 20 números del conjunto hay siempre 2 cuyo último dígito es 0 y al menos uno de los dos tendrá como dígito de las decenas un número distinto de 9. Sea  $m$  ese número y  $S$  la suma de sus dígitos. Entonces los números  $m, m+1, \dots, m+9$  y  $m+19$  que están en el conjunto inicial de los 39 enteros positivos consecutivos, tendrán respectivamente como suma de sus dígitos  $S, S+1, \dots, S+9$  y  $S+10$ . Claramente entre estos *once* enteros consecutivos, hay siempre uno de ellos que es divisible por 11.