

PREMIOS JORGE JUAN 2013
PROBLEMA DE ESTADÍSTICA

Elegir entre la opción A y la B

OPCION A

Sea X una variable aleatoria cuya función de densidad es

$$f_{\theta}(x) = 1, \quad \theta - \frac{1}{2} \leq x \leq \theta + \frac{1}{2}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Consideremos una m.a.s. de X , (X_1, \dots, X_n) y el estadístico $S = (X_{(1)}, X_{(n)})$

a) Demostrar que S es un estadístico suficiente para θ .

En la mayoría de textos de Inferencia Estadística, aparece el siguiente resultado: "Cualquier estimador de máxima verosimilitud (EMV) de θ debe ser función de cualquier estadístico suficiente para θ ". En realidad, este resultado es cierto cuando el EMV de θ es único. Si no es único, se pueden encontrar EMV's función del estadístico suficiente, pero pueden existir EMV's que no lo sean.

b) Demostrar que cualquier combinación convexa de $X_{(n)} - \frac{1}{2}$ y $X_{(1)} + \frac{1}{2}$ es un EMV de θ . Por tanto, todos son función de S , pero no existe unicidad.

c) Demostrar que podemos elegir un EMV de θ que no sea función de S :

$$\hat{\theta} = \left(X_{(n)} - \frac{1}{2} \right) + h(X_1, \dots, X_n) (X_{(1)} - X_{(n)} + 1),$$

donde $h(x_1, \dots, x_n)$ es una función no constante que debe cumplir ciertas condiciones. Poner un ejemplo.

- Un estadístico $S(X_1, \dots, X_n)$ es suficiente para θ si, $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, la función de densidad o probabilidad de (X_1, \dots, X_n) se puede factorizar

$$f_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = b(x_1, \dots, x_n) k(\theta, S(x_1, \dots, x_n)).$$

- Un EMV de θ es un estadístico que maximiza la función de verosimilitud de θ , para cada realización de la m.a.s., siendo la función de verosimilitud

$$L_{(x_1, \dots, x_n)}(\theta) = f_{\theta}(x_1, \dots, x_n),$$

para cada (x_1, \dots, x_n) en el soporte de (X_1, \dots, X_n) .

OPCION B

a) Un conjunto de variables aleatorias X_1, \dots, X_n se dice *intercambiable* si la distribución conjunta del vector (X_1, \dots, X_n) es la misma que la de cualquier permutación de las n variables. Sean X_1, \dots, X_n variables aleatorias positivas e intercambiables. Probar que

$$E\left(\frac{X_1 + \dots + X_k}{X_1 + \dots + X_n}\right) = \frac{k}{n}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

b) Sea X una variable aleatoria con soporte $\{0, 1, 2, \dots\}$. Probar que

$$\sum_{n=0}^{\infty} s^n P(X \leq n) = \frac{1}{1-s} P(s), \quad |s| < 1,$$

donde $P(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k P(X = k)$ es la *función generatriz de probabilidad* de X .

- Si $f(x_1, \dots, x_n)$ es la función de densidad conjunta del vector aleatorio continuo (X_1, \dots, X_n) , la esperanza de la variable aleatoria función del vector, $h(X_1, \dots, X_n)$, (con $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$) se define

$$E(h(X_1, \dots, X_n)) := \int \dots \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Si el vector aleatorio es de tipo discreto y $f(x_1, \dots, x_n)$ es su función de probabilidad conjunta,

$$E(h(X_1, \dots, X_n)) := \sum_{\mathbb{R}^n} h(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n).$$

SOLUCIONES OPCION A

a) La función de densidad de la m.a.s. se puede factorizar

$$f_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = I_{]-\infty, \theta + \frac{1}{2}]}(x_{(n)}) I_{[\theta - \frac{1}{2}, \infty[}(x_{(1)}),$$

para todo $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, siendo

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

la función indicatriz de un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ en nuestro caso.

Así, el estadístico $S = (X_{(1)}, X_{(n)})$ es suficiente para θ .

b) La función de verosimilitud, para cada realización (x_1, \dots, x_n) de la m.a.s. es

$$L_{(x_1, \dots, x_n)}(\theta) = 1,$$

si $x_{(n)} - \frac{1}{2} \leq \theta \leq x_{(1)} + \frac{1}{2}$. Al ser constantemente igual a 1 en el intervalo $[x_{(n)} - \frac{1}{2}, x_{(1)} + \frac{1}{2}]$, cualquier combinación convexa de $x_{(n)} - \frac{1}{2}$ y $x_{(1)} + \frac{1}{2}$ será un máximo de la función. Así,

$$\hat{\theta}_{\alpha} = \alpha \left(X_{(n)} - \frac{1}{2} \right) + (1 - \alpha) \left(X_{(1)} + \frac{1}{2} \right),$$

con $0 \leq \alpha \leq 1$ son EMV de θ .

c) Si $\hat{\theta} = (X_{(n)} - \frac{1}{2}) + h(X_1, \dots, X_n)(X_{(1)} - X_{(n)} + 1)$ es EMV de θ , la función de verosimilitud en $\hat{\theta}$ debe valer 1, luego, para toda realización (x_1, \dots, x_n) , $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ debe estar en el intervalo $[x_{(n)} - \frac{1}{2}, x_{(1)} + \frac{1}{2}]$, es decir,

$$\left| \hat{\theta} - x_{(n)} + \frac{1}{2} \right| \leq x_{(1)} - x_{(n)} + 1,$$

así, $0 \leq h(x_1, \dots, x_n) \leq 1$, para toda (x_1, \dots, x_n) .

Podemos tomar, por ejemplo, $h(x_1, \dots, x_n) = \cos^2 x_1$.

SOLUCIONES OPCION B

a) Dado que $E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{X_1 + \dots + X_n}\right) = 1$, deducimos que

$$\sum_{i=1}^n E\left(\frac{X_i}{X_1 + \dots + X_n}\right) = 1.$$

Al ser las variables aleatoria positivas, se tiene que

$$E\left(\frac{X_i}{X_1 + \dots + X_n}\right) \geq 0, \text{ para todo } i = 1, \dots, n,$$

luego si la suma es uno, necesariamente todas son finitas. Veamos que todas son iguales, por lo que $E\left(\frac{X_i}{X_1+\dots+X_n}\right) = \frac{1}{n}$ y ya habremos llegado al resultado deseado.

Al ser intercambiables, lo haremos para X_1 y X_2 . Supondremos el caso continuo, y si fuera discreto, basta cambiar integrales por sumas.

$$\begin{aligned} E\left(\frac{X_1}{X_1+\dots+X_n}\right) &= \int \dots \int_{\mathbb{R}^n} \frac{x_1}{x_1+\dots+x_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int \dots \int_{\mathbb{R}^n} x_1 g(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n, \end{aligned}$$

siendo $g(x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{x_1+\dots+x_n}$ una función a su vez intercambiable. Así

$$E\left(\frac{X_1}{X_1+\dots+X_n}\right) = \int x_1 \left[\int \dots \int_{\mathbb{R}^{n-1}} g(x_1, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n \right] dx_1.$$

Si $G(x_1) := \int \dots \int_{\mathbb{R}^{n-1}} g(x_1, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n$, tenemos que

$$E\left(\frac{X_1}{X_1+\dots+X_n}\right) = \int x_1 G(x_1) dx_1.$$

Claramente $G(x_1) = G(x_2)$, por ser $g(x_1, \dots, x_n)$ intercambiable, de manera que

$$E\left(\frac{X_1}{X_1+\dots+X_n}\right) = \int x_1 G(x_1) dx_1 = \int x_2 G(x_2) dx_2 = E\left(\frac{X_2}{X_1+\dots+X_n}\right).$$

b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} s^n P(X \leq n) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=n}^{\infty} s^k \right) P(X = n) = \frac{1}{1-s} \sum_{n=0}^{\infty} s^n P(X = n).$$