

IV PREMIOS JORGE JUAN 2001

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Denotemos por \mathcal{X} la familia de conjuntos cerrados del plano, X , tales que

$$\sup \{ \|x - y\| \mid x \in X, y \in X \} < \infty$$

y cuya frontera es una curva suave de longitud $L > 0$ que no contiene segmentos. Se pide:

(a) Demostrar que, para todo $X \in \mathcal{X}$ existen dos elementos \bar{x} e \bar{y} en la frontera de X tales que $\|\bar{x} - \bar{y}\| = \sup \{ \|x - y\| \mid x \in X, y \in X \}$ (decimos entonces que $[\bar{x}, \bar{y}]$ es un diámetro de X).

(b) Proponer un modelo cuya solución permita encontrar el conjunto $Z \in \mathcal{X}$ que encierra mayor área, especificando las hipótesis (se sugiere utilizar (a)).

(c) Proponer un modelo de programación matemática que permita aproximar la solución, Z , del problema isoperimétrico del apartado (b).

(d) Justificar la convexidad del conjunto Z .

(e) Justificar la existencia de dos puntos en la frontera de Z , \bar{x} e \bar{y} , que la dividen en dos curvas de igual longitud y probar que la recta determinada por \bar{x} e \bar{y} divide a Z en dos regiones que tienen igual área.

(f) Razonar la clase de conjunto que es Z . Se sugiere utilizar (e) y observar que el triángulo de mayor área que puede construirse con dos lados fijos es el triángulo rectángulo que tiene a tales lados por catetos.

NOTA: Cuando se utilicen argumentos intuitivos, debe señalarse expresamente.

Solución:

(a) La condición $\sup \{\|x - y\| \mid x \in X, y \in X\} < \infty$ equivale a la acotación de X . Por lo tanto, los elementos de \mathcal{X} son compactos. Si $X \in \mathcal{X}$, $X \times X$ es compacto y $f(x, y) = \|x - y\|$ es continua sobre él, por lo que alcanza su máximo en el par (\bar{x}, \bar{y}) del enunciado.

(b) Tomando un sistema de referencia en el plano tal que el eje de abscisas contenga a un diámetro, cuyos extremos podemos escribir como $(a, 0)$ y $(b, 0)$, $a < b$, X está contenido en la banda limitada por las rectas $x = a$ e $x = b$, siendo soluciones dominadas aquellos conjuntos X tales que las rectas $x = c$, con $a < c < b$, cortan a la frontera de X en más de dos puntos. Podemos considerar, pues, conjuntos de la forma

$$X = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\},$$

donde $y_1(x)$ e $y_2(x)$ son funciones reales sobre $[a, b]$ continuamente diferenciables por la hipótesis de suavidad de la frontera de X , que es la unión de las correspondientes gráficas. Tomaremos tales funciones como incógnitas, es decir,

$$y_1(x) = \min \{y \mid (x, y) \in X\}, a \leq x \leq b,$$

e

$$y_2(x) = \max \{y \mid (x, y) \in X\}, a \leq x \leq b,$$

con lo que el modelo a resolver es

$$(P) \quad \begin{array}{l} \text{Max} \quad \int_a^b [y_2(x) - y_1(x)] dx \\ \text{s.a} \quad y_1(a) = y_2(a) = y_1(b) = y_2(b) = 0 \\ \quad \quad y_1(x) \leq y_2(x), x \in [a, b] \\ \quad \quad \int_a^b \left\{ \sqrt{1 + [y_1'(x)]^2} + \sqrt{1 + [y_2'(x)]^2} \right\} dx = L \\ \quad \quad y_1, y_2 \in C^1([a, b]). \end{array}$$

Si la solución óptima de (P) es (\bar{y}_1, \bar{y}_2) , entonces

$$Z = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \bar{y}_1(x) \leq y \leq \bar{y}_2(x)\}.$$

Hay que señalar que no se ha probado que (P) tenga solución óptima, ni que ésta sea única. Supondremos que es así.

(c) Sean $n \in \mathbb{N}$, $\Delta = \frac{b-a}{n}$ y $t_k = a + (k-1)\Delta$, $k = 1, \dots, n+1$ (partición de $[a, b]$ en n subintervalos iguales). Sean $u_k = y_1(t_k)$ y $v_k = y_2(t_k)$, $k = 1, \dots, n+1$, las incógnitas del problema aproximante, en el que las integrales se sustituyen por sumas de Riemann correspondientes a los extremos inferiores de los subintervalos (la elección es libre):

$$\begin{aligned}
(P_A) \quad & \text{Max} \quad \sum_{k=1}^n (v_k - u_k) \\
\text{s.a} \quad & u_1 = v_1 = u_{n+1} = v_{n+1} = 0 \\
& u_k \leq v_k, k = 1, \dots, n+1 \\
& \sum_{k=1}^n \left\{ \sqrt{1 + \left(\frac{u_{k+1} - u_k}{\Delta} \right)^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{v_{k+1} - v_k}{\Delta} \right)^2} \right\} = L. \\
& u_k, v_k \in \mathbb{R}, k = 1, \dots, n+1.
\end{aligned}$$

(d) Si Z contiene dos puntos, x e y , tales que $[x, y] \not\subseteq Z$, entonces es fácil obtener un conjunto del mismo perímetro que Z pero de mayor área (sustituyendo los arcos cóncavos por sus simétricos). El argumento es intuitivo.

(e) Se toma un punto fijo en la frontera, \bar{y} , y otro, variable, x , que se desplaza sobre la frontera en el sentido positivo (por ejemplo) a partir de \bar{y} . La longitud del arco de frontera entre \bar{y} y x es una función continua, $f(x)$, que toma valores entre 0 (al salir de y) y L (al llegar a y), debiendo existir un punto \bar{x} , de la frontera de Z , tal que $f(\bar{x}) = \frac{L}{2}$. La clave del argumento es la continuidad de $f(x)$, que aceptamos intuitivamente.

Si una de las dos regiones, en que la recta determinada por \bar{x} e \bar{y} es más extensa que la otra, por simetría se logra una figura con el mismo perímetro que Z pero de área mayor.

(f) Se trata de probar que las dos curvas de longitud $\frac{L}{2}$ en que el segmento $[\bar{x}, \bar{y}]$, del apartado (e), divide a la frontera de Z son semicircunferencias (por lo que Z es un círculo). Se argumenta por reducción al absurdo, suponiendo que desde un punto de tales arcos se ve $[\bar{x}, \bar{y}]$ bajo un ángulo diferente a 90° y probando que, en tal caso, hay una figura de igual perímetro, L , pero de mayor área que Z .